

# Μαθηματικά Κατεύθυνσης

## 1<sup>o</sup> ΘΕΜΑ

Δίνεται η  $f: R \rightarrow R$  για την οποία ισχύει η σχέση  $3 \cdot f(x) - 2 \cdot f(-x) = 5x - 3$ , για κάθε  $x \in R$ .

i) Να βρείτε τον τύπο της  $f$

ii) Να βρείτε το  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(f(x) + 3) \cdot \eta \mu \frac{1}{x}]$

iii) Αν είναι  $(gof)(x) = x^2 + 1$ , για κάθε  $x \in R$  να βρείτε τον τύπο της  $g$

## 2<sup>o</sup> ΘΕΜΑ

Έστω η συνεχής συνάρτηση  $f$  στο  $[a, b]$  και οι μιγαδικοί  $z = f(\beta) - i\beta^2$  και  $w = f(a) + ia^2$  με  $|w + z| < |w - z|$ . Να δείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον  $\xi \in (a, b)$  ώστε  $f(\xi) = 0$ .

## 3<sup>o</sup> ΘΕΜΑ

Αν για την συνάρτηση  $f: R \rightarrow R$  ισχύει  $f^3(x) + f(x) + x = 4$ , για κάθε  $x \in R$  να δείξετε ότι:

i) Η  $f$  είναι συνάρτηση "1-1"

ii) Να βρείτε την  $f^{-1}$

iii) Να λύσετε την εξίσωση  $f(e^x) = f(1-x)$

iv) Να βρείτε το  $\lim_{x \rightarrow 0} [(4 - f^{-1}(x)) \cdot \eta \mu \frac{1}{x}]$

## 4<sup>o</sup> ΘΕΜΑ

a) Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} |z-2| + \frac{2x^2 - 5x + 2}{x^2 - 4}, & x < 2 \\ |z+i| + x - \frac{5}{4}, & x \geq 2 \end{cases}$$

Αν η  $f$  είναι συνεχής στο  $x_0 = 2$  να δείξετε ότι η εικόνα του μιγαδικού  $z$  κινείται σε ευθεία της οποίας να προσδιορίσετε την εξίσωση.

β) Από τους μιγαδικούς  $z$  του ερωτήματος (a) να βρεθεί εκείνος που έχει το ελάχιστο μέτρο

## ΛΥΣΕΙΣ

### ΛΥΣΗ 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ

i) Δίνεται ότι  $3 \cdot f(x) - 2 \cdot f(-x) = 5x - 3$ , για κάθε  $x \in R$ . Θέτουμε όπου  $x$  το  $-x$  και έχουμε  $3 \cdot f(-x) - 2 \cdot f(x) = -5x - 3$ , όπου λύνουμε το σύστημα

$$\left( \Sigma \right) \begin{cases} 3 \cdot f(x) - 2 \cdot f(-x) = 5x - 3 \\ 3 \cdot f(-x) - 2 \cdot f(x) = -5x - 3 \end{cases} \text{ και παίρνουμε}$$

$$f(x) = x - 3$$

$$ii) \lim_{x \rightarrow +\infty} [(f(x) + 3) \cdot \eta \mu \frac{1}{x}] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x - 3 + 3) \cdot \eta \mu \frac{1}{x}]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x \cdot \eta \mu \frac{1}{x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta \mu \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}, \text{ θέτω } \frac{1}{x} = u \text{ οπότε}$$

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\eta \mu u}{u} = 1$$

$$iii) \text{ Δίνεται } gof(x) = x^2 + 1 \\ g(f(x)) = x^2 + 1 \Leftrightarrow g(x-3) = x^2 + 1 \Leftrightarrow g(\omega) = \omega^2 + 6\omega + 10. \text{ Άρα } g(x) = x^2 + 6x + 10 \text{ για κάθε } x \in R$$

### ΛΥΣΗ 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ

$$|w + z| < |w - z| \Leftrightarrow$$

$$|f(\alpha) + i\alpha^2 + f(\beta) + i\beta^2| < |f(\alpha) - i\alpha^2 - f(\beta) + i\beta^2| \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow |(f(\alpha) + f(\beta)) + i(\alpha^2 + \beta^2)| < |(f(\alpha) - f(\beta)) + i(\beta^2 - \alpha^2)| \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \sqrt{(f(\alpha) + f(\beta))^2 + (\alpha^2 + \beta^2)^2} < \sqrt{(f(\alpha) - f(\beta))^2 + (\beta^2 - \alpha^2)^2} \\ \Leftrightarrow f^2(\alpha) + f^2(\beta) + 2f(\alpha)f(\beta) + \alpha^4 + 2\alpha^2\beta^2 < f^2(\alpha) + f^2(\beta) - \\ - 2f(\alpha)f(\beta) + \alpha^4 - 2\alpha^2\beta^2 \Leftrightarrow 4f(\alpha)f(\beta) < -4\alpha^2\beta^2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow f(\alpha)f(\beta) < -\alpha^2\beta^2 \Leftrightarrow f(\alpha)f(\beta) < 0$$

Η θεώρηση της υποθέσεις του Bolzano στο  $[a, b]$  άρα υπάρχει  $\xi \in (a, b)$  τέτοιο ώστε  $f(\xi) = 0$

### ΛΥΣΗ 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ

i)  $f^3(x) + f(x) + x = 4$  άρα  $f^3(x) + f(x) = 4 - x$  (1) για κάθε  $x \in R$ . Τότε για κάθε  $x_1, x_2 \in R$  με  $f(x_1) = f(x_2)$  έχουμε

$$\left. \begin{array}{l} f^3(x_1) = f^3(x_2) \\ f(x_1) = f(x_2) \end{array} \right\} \text{ (+)} \text{ αρα } f^3(x_1) + f(x_1) = f^3(x_2) + f(x_2) \Leftrightarrow$$

$$4 - x_1 = 4 - x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Άρα η  $f$  είναι "1-1".

ii) Αν θέσουμε  $y = f(x)$  τότε η  $f^3(x) + f(x) + x = 4$  γίνεται  $y^3 + y + x = 4 \Leftrightarrow x = 4 - y^3 - y \Leftrightarrow f^{-1}(y) = 4 - y^3 - y$  ή  $f^{-1}(x) = -x^3 - x + 4, x \in R$  ( $f(R) = R$ ).

iii)  $f(e^x) = f(1-x)$

Επειδή η  $f$  είναι "1-1" άρα  $e^x = 1-x \Leftrightarrow e^x + x - 1 = 0$

Προφανής ρίζα  $x = 0$  διότι  $e^0 + 0 - 1 = 1 - 1 = 0$

Η συνάρτηση  $h$  με  $h(x) = e^x + x - 1$  είναι γνήσια αύξουσα διότι για κάθε  $x_1, x_2 \in R$  με

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1 - 1 < x_2 - 1$$

$$\text{και } e^{x_1} < e^{x_2}$$

προσθέτοντας κατά μέλη έχω

$$e^{x_1} + x_1 - 1 < e^{x_2} + x_2 - 1 \Leftrightarrow h(x_1) < h(x_2),$$

άρα η  $h$  είναι "1-1" οπότε  $x = 0$  μοναδική ρίζα.

iv) Είναι

$$(4 - f^{-1}(x)) \eta \mu \frac{1}{x} = (4 - (4 - y^3 - y)) \eta \mu \frac{1}{x} = (y^3 + y) \eta \mu \frac{1}{x}$$

ισχύει

$$|(x^3 + x) \eta \mu \frac{1}{x}| \leq |x^3 + x| \Leftrightarrow -|x^3 + x| \leq (x^3 + x) \eta \mu \frac{1}{x}.$$

$$\leq |x^3 + x|$$

$$\text{το } \lim_{x \rightarrow 0} |x^3 + x| = 0,$$

άρα από κριτήριο παρεμβολής και  $\lim_{x \rightarrow 0} (x^3 + x) \eta \mu \frac{1}{x} = 0$

### ΛΥΣΗ 4ου ΘΕΜΑΤΟΣ

a) Αφού  $f$  συνεχής στο  $x_0 = 2$

Άρα  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$  (1)

Είναι

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \left( |z-2| + \frac{2x^2 - 5x + 2}{x^2 - 4} \right) =$$

$$= |z-2| + \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2}{(x-2)(x+2)} = |z-2| + \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x-1}{x+2} = |z-2| + \frac{3}{4}$$

Είναι

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left( |z+i| + x - \frac{5}{4} \right) = |z+i| + 2 - \frac{5}{4} = |z+i| + \frac{3}{4} = f(2)$$

Άρα λόγω της (1) θα πρέπει


$$|z-2| + \frac{3}{4} = |z+i| + \frac{3}{4} \Leftrightarrow |z-2| = |z+i| \Leftrightarrow$$

$$|(x-2) + yi| = |x + (y+1)i| \Leftrightarrow \sqrt{(x-2)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + (y+1)^2} \Leftrightarrow$$

$$4x + 2y - 3 = 0$$

**Σχόλιο:** Η εικόνα του  $z$  κινείται στη μεσοκάθετη του τμήματος  $AB$  όπου  $A(2, 0)$ ,  $B(0, -1)$  που είναι οι εικόνες των μιγαδικών  $z_1 = 2 + 0i$ ,  $z_2 = 0 - 1i$  βάσει της ισότητας  $|z-2| = |z+i|$ .

β)



$$(\eta) \perp (\varepsilon) \lambda_\varepsilon \cdot \lambda_\eta = -1 \Leftrightarrow -2 \cdot \lambda_\eta = -1 \Leftrightarrow \lambda_\eta = 1/2$$

άρα  $(\eta) : y = 1/2 \cdot x$

$$\text{Λύνω το } (\Sigma) \left\{ \begin{array}{l} 4x + 2y - 3 = 0 \\ y = \frac{1}{2}x \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 3/5 \\ y = 3/10 \end{array} \right.$$

άρα ο  $z_0 = \frac{3}{5} + \frac{3}{10}i$  έχει το ελάχιστο μέτρο

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

**ΧΑΣΙΑΚΗΣ**  
στον ΠΕΙΡΑΙΑ