

**ΤΑΞΗ:** Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
**ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ:** ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
**ΜΑΘΗΜΑ:** ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

**ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

**Θέμα Α**

**A4.** α) Σωστό β) Λάθος γ) Λάθος δ) Σωστό ε) Λάθος

**Θέμα Β**

**B1.** Η  $f = \text{φ} \circ \text{g}$  ορίζεται για  $x > 0$  και  $\ln x \neq 0$  δηλαδή όταν  $0 < x \neq 1$  με τύπο  $(\text{φ} \circ \text{g})(x) = \frac{e^{\ln x}}{\ln x} = \frac{x}{\ln x}$

**B2.**  $f'(x) = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}$  Το πρόσημο της  $f'$  και η μονοτονία της  $f$  φαίνεται στο διπλανό πίνακα.

|         |            |            |            |           |
|---------|------------|------------|------------|-----------|
| $x$     | 0          | 1          | $e$        | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | -          | -          | +          |           |
| $f(x)$  | $\searrow$ | $\searrow$ | $\nearrow$ |           |

Η  $f$  για  $x = e$  παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο το  $f(e) = e$ .

**B3.**  $f''(x) = \frac{\frac{1}{x}(\ln x)^2 - \frac{2}{x} \ln x (\ln x - 1)}{(\ln x)^4} = \frac{\ln x \cdot (-\ln x + 2)}{x \cdot (\ln x)^4}$

|          |       |       |       |           |
|----------|-------|-------|-------|-----------|
| $x$      | 0     | 1     | $e^2$ | $+\infty$ |
| $f''(x)$ | -     | +     | -     |           |
| $f(x)$   | κοίλη | κυρτή | κοίλη |           |

Είναι  $\ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1$

$-\ln x + 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq e^2$

Η  $f$  για  $x = e^2$  παρουσιάζει καμπή

$M\left(e^2, \frac{e^2}{2}\right)$  το σημείο καμπής.

**B4.** •  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x \cdot \frac{1}{\ln x}\right) = 0$  διότι  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$

Άρα η  $C_f$  δεν έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη όταν  $x \rightarrow 0^+$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left( x \cdot \frac{1}{\ln x} \right) = 1 \cdot (-\infty) = -\infty$$

διότι  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln x = 0$  και  $\ln x < 0$  αριστερά του 1.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left( x \cdot \frac{1}{\ln x} \right) = 1 \cdot (+\infty) = +\infty$$


διότι  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln x = 0$  και  $\ln x > 0$  δεξιά του 1.

Άρα η  $x=1$  είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της  $C_f$  όταν  $x \rightarrow 1$ .

**Πίνακας μεταβολών της  $f$**

| $x$      | 0 | 1         | $e$ | $e^2$           | $+\infty$ |
|----------|---|-----------|-----|-----------------|-----------|
| $f'(x)$  | - | -         | +   | +               | +         |
| $f''(x)$ | - | +         | +   | -               | -         |
| $f(x)$   | 0 | $+\infty$ | $e$ | $\frac{e^2}{2}$ | $+\infty$ |

**Γραφική παράσταση**



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad f(e) = e, \quad f(e^2) = \frac{e^2}{2}$$

**Θέμα Γ**

**Γ1.** • Η  $f$  είναι συνεχής στο  $x=0$ , άρα  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$

$$\text{απ' όπου προκύπτει } \alpha = 1 + \beta \quad (1)$$

$$\bullet f\left(-\frac{\pi}{4}\right) \cdot f(e-1) < 0 \Leftrightarrow (\alpha-1) \cdot (2+\beta) < 0 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} (\alpha-1) \cdot (\alpha+1) < 0 \Leftrightarrow$$

$$-1 < \alpha < 1. \text{ Επειδή } \alpha \in \mathbb{Z} \text{ είναι } \alpha = 0 \text{ οπότε } \beta = -1$$

**Γ2.** Για κάθε  $x > 0$ ,  $f(x) - \frac{x^2 - x}{2} \leq \ln \lambda \quad (2)$

Έστω  $\varphi(x) = \ln(x+1) - \frac{x^2 - x}{2}$ ,  $x > 0$ . Είναι  $\varphi'(x) = \dots = \frac{-2x^2 - x + 3}{2(x+1)}$

| $x$           | 0             | 1             | $+\infty$ |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| $\varphi'(x)$ | +             | -             |           |
| $\varphi(x)$  | $\rightarrow$ | $\rightarrow$ |           |

Η μονοτονία της  $\varphi$  φαίνεται στο διπλανό πίνακα.

Η  $\varphi$  για  $x=1$  παρουσιάζει μέγιστο το  $\varphi(1) = \ln 2$ .

Ισχύει η (2) για κάθε  $x > 0$  και  $\lambda > 0$  όταν  $\max \varphi(x) \leq \ln \lambda \Leftrightarrow \ln 2 \leq \ln \lambda \Leftrightarrow \lambda \geq 2$ . Η μικρότερη τιμή του  $\lambda$  είναι  $\lambda = 2$ .

Γ3.  $I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \varepsilon \varphi x \, dx + \int_0^{e-1} \ln(x+1) \, dx = I_1 + I_2$

- $$I_1 = \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \varepsilon \varphi x \, dx = \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \frac{\eta \mu x}{\sigma \upsilon \nu x} \, dx = - \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \frac{(\sigma \upsilon \nu x)'}{\sigma \upsilon \nu x} \, dx = - \left[ \ln(\sigma \upsilon \nu x) \right]_{-\frac{\pi}{4}}^0 =$$

$$= -\ln(\sigma \upsilon \nu 0) + \ln\left(\sigma \upsilon \nu\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) = \dots = -\frac{1}{2} \ln 2$$

- $$I_2 = \int_0^{e-1} (x+1)' \ln(x+1) \, dx = \int_1^e u' \ln u \, du = (\text{θέτω } x+1 = u)$$

$$= [u \cdot \ln u]_1^e - \int_1^e 1 \cdot du = e - (e-1) = 1$$

Άρα  $I = -\frac{1}{2} \ln 2 + 1$

Γ4. Είναι  $\varepsilon \varphi \theta = f'(\alpha) = \frac{1}{\alpha+1}$ ,  $\alpha > 0$ . Τα  $\alpha$  και  $\theta$  είναι συναρτήσεις του χρόνου  $t$ , έστω  $\alpha(t)$  και  $\theta(t)$  αντίστοιχα.

Έχουμε  $\varepsilon \varphi \theta(t) = \frac{1}{\alpha(t)+1}$  οπότε  $\theta'(t) \cdot \frac{1}{\sigma \upsilon \nu^2 \theta(t)} = -\frac{\alpha'(t)}{(1+\alpha(t))^2}$

- Για  $t = t_0$ ,  $\theta'(t_0) = -\frac{\alpha'(t_0)}{(1+\alpha(t_0))^2} \cdot \sigma \upsilon \nu^2 \theta(t_0)$  (3)

Τη χρονική στιγμή  $t_0$  ισχύουν  $\alpha'(t_0) = 1 \frac{cm}{sec}$  και  $\alpha(t_0) = \sqrt{3} - 1$

Είναι  $\varepsilon \varphi \theta(t_0) = \frac{1}{\alpha(t_0)+1} = \frac{1}{\sqrt{3}-1+1} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ . Άρα  $\theta(t_0) = \frac{\pi}{6}$  και

$$\text{συν}\theta(t_0) = \text{συν}\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}. \text{ Επομένως με αντικατάσταση στην (3) προκύπτει :}$$

$$\theta'(t_0) = -\frac{1}{(\sqrt{3}-1+1)^2} \cdot \frac{3}{4} = -\frac{1}{4} \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$$


**Θέμα Δ**

**Δ1.** Για  $x=0$  είναι  $f(0)=1$  οπότε ισχύει  $f(x) \geq f(0)$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .

Άρα η  $f$  στο  $x_0=0$  παρουσιάζει ελάχιστο, είναι παραγωγίσιμη σ' αυτό και το 0 είναι εσωτερικό σημείο. Σύμφωνα με το Θ. Fermat είναι  $f'(0)=0$ . Επομένως  $e^0 - \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 1$ .

**Δ2.** Η εξίσωση της εφαπτομένης στο  $M(1, e-1)$  είναι

$$\varepsilon : y - f(1) = f'(1)(x-1) \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow y = (e-1)x$$



Το ζητούμενο εμβαδόν

$$E = \int_0^1 |f(x) - (e-1)x| dx$$

επειδή  $f''(x) = e^x > 0$  η  $f$  είναι κυρτή.

Άρα  $f(x) \geq (e-1)x$  οπότε

$$E = \int_0^1 (e^x - x - ex + x) dx = \int_0^1 (e^x - ex) dx = \left[ e^x - e\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = e - \frac{e}{2} - 1 = \frac{e}{2} - 1 \text{ τ.μ.}$$

**Δ3.**  $g(x) = \ln e^x - \ln(e^x - x) = x - \ln(e^x - x), x \in \mathbb{R}$

$$g'(x) = 1 - \frac{e^x - 1}{e^x - x} \text{ και } g''(x) = \frac{(x-2)e^x + 1}{(e^x - x)^2} = \frac{h(x)}{(e^x - x)^2}, \text{ όπου } h(x) = (x-2)e^x + 1, x \in \mathbb{R}$$

➤ Αρκεί να αποδείξουμε ότι η εξίσωση  $g''(x) = 0$  έχει ακριβώς δύο λύσεις  $x_1, x_2$  και στη συνέχεια ότι η  $g''(x)$  αλλάζει πρόσημο αριστερά και δεξιά των  $x_1, x_2$ .

Δηλαδή αρχικά ότι η  $h(x) = 0$  έχει ακριβώς δύο λύσεις, βρίσκοντας το σύνολο τιμών της.

- Είναι  $h(x) = (x-2)e^x + 1, \quad h'(x) = e^x + (x-2)e^x = (x-1)e^x$

|         |           |            |       |            |           |
|---------|-----------|------------|-------|------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $x_1$      | $1$   | $x_2$      | $+\infty$ |
| $h'(x)$ |           | -          |       | +          |           |
| $h(x)$  | 1         | $\searrow$ | $1-e$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

$$h(1) = 1 - e$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)e^x = +\infty \text{ και}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x-2)e^x + 1] = 0 + 1 = 1 \text{ διότι}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-2}{\frac{1}{e^x}} = \left( \frac{-\infty}{+\infty} \right) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x-2)'}{\left( \frac{1}{e^x} \right)'} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-\frac{1}{e^x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-e^x) = 0$$

- Αν  $x \in (-\infty, 1] = A_1$  τότε  $h(A_1) = [1-e, 1)$  και η  $h \downarrow$   
Επειδή  $0 \in h(A_1)$  η εξίσωση  $h(x) = 0$  έχει ακριβώς μια λύση  $x_1 \in (-\infty, 1)$ , επομένως και η  $g''(x) = 0$ .
- Αν  $x \in [1, +\infty) = A_2$  τότε  $h(A_2) = [1-e, +\infty)$  και η  $h \uparrow$   
Επειδή  $0 \in h(A_2)$  η εξίσωση  $h(x) = 0$  έχει ακριβώς μια λύση  $x_2 \in (1, +\infty)$ , επομένως και η  $g''(x) = 0$ .
- Θα βρούμε το πρόσημο της  $h(x)$  στο  $(-\infty, 1)$  από τη μονοτονία της και τη ρίζα της  $x_1$ .
  - Για κάθε  $x < x_1$  είναι  $h(x) > h(x_1) = 0$  και για κάθε  $x_1 < x < 1$  είναι  $h(x) < h(x_1) = 0$
- Όμοια το πρόσημο της  $h(x)$  στο  $(1, +\infty)$  από τη μονοτονία της και τη ρίζα της  $x_2$ .
  - Για κάθε  $1 < x < x_2$  είναι  $h(x) > h(x_2) = 0$  και για κάθε  $x > x_2$  είναι  $h(x) < h(x_2) = 0$ .  
Το πρόσημο της  $h(x)$  είναι και πρόσημο της  $g''(x)$ .

|          |           |       |     |       |           |
|----------|-----------|-------|-----|-------|-----------|
| $x$      | $-\infty$ | $x_1$ | $1$ | $x_2$ | $+\infty$ |
| $g''(x)$ | +         | -     | -   | +     |           |
| $g(x)$   | κυρτή     | κοίλη |     | κυρτή |           |

Επομένως όπως φαίνεται στο διπλανό πίνακα η συνάρτηση  $g$  παρουσιάζει καμπή ακριβώς στα  $x_1$  και  $x_2$

**Δ4.** Εφαρμόζεται το Θ.Μ.Τ. για τη συνάρτηση  $g$  στο  $[x_1, 1]$ .

Άρα υπάρχει  $\xi_1 \in (x_1, 1)$  τέτοιος ώστε

$$g'(\xi_1) = \frac{g(1) - g(x_1)}{1 - x_1} \Leftrightarrow (1 - x_1) \cdot g'(\xi_1) = g(1) - g(x_1) \quad (1)$$

- Εφαρμόζεται το Θ.Μ.Τ. για τη συνάρτηση  $g$  στο  $[1, x_2]$ .

Άρα υπάρχει  $\xi_2 \in (1, x_2)$  τέτοιος ώστε

$$g'(\xi_2) = \frac{g(x_2) - g(1)}{x_2 - 1} \Leftrightarrow (x_2 - 1) \cdot g'(\xi_2) = g(x_2) - g(1) \quad (2)$$

### α' μέθοδος

- Η  $g(x)$  είναι κοίλη στο  $[x_1, x_2]$ , άρα  $g' \downarrow$  οπότε από  $x_1 < \xi_1 < 1$  έχουμε  $1 - x_1 > 0$  και  $g'(\xi_1) > g'(1) = 0$ .

$$\text{Επομένως } (1 - x_1)g'(\xi_1) > 0 \quad (3)$$

- από  $1 < \xi_2 < x_2$  έχουμε  $x_2 - 1 > 0$  και  $g'(\xi_2) < g'(1) = 0$ .

$$\text{Επομένως } (x_2 - 1)g'(\xi_2) < 0 \quad (4)$$

Συνεπώς από (3) και (4) προκύπτει:  $(1 - x_1)g'(\xi_1) > (x_2 - 1)g'(\xi_2)$

### β' μέθοδος

$$\text{Είναι } g'(x) = 1 - \frac{e^x - 1}{e^x - x} = \frac{-x + 1}{e^x - 1}$$

- Η  $g \uparrow$  στο  $(-\infty, 1]$  και  $x_1 < 1$  άρα  $g(1) > g(x_1) \Leftrightarrow g(1) - g(x_1) > 0$ .

$$\text{Επομένως από την (1) συμπεραίνουμε ότι: } (1 - x_1)g'(\xi_1) > 0 \quad (5).$$

- Η  $g \downarrow$  στο  $[1, +\infty)$  και  $x_2 > 1$  άρα  $g(x_2) < g(1) \Leftrightarrow g(x_2) - g(1) < 0$ .

$$\text{Επομένως από τη (2) συμπεραίνουμε ότι: } (x_2 - 1)g'(\xi_2) < 0 \quad (6).$$

Συνεπώς από (5) και (6) προκύπτει:  $(1 - x_1)g'(\xi_1) > (x_2 - 1)g'(\xi_2)$

Δημήτρης Γεωργακίλας