

## ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

E\_3.Μλ2ΓΑ(α)

**ΤΑΞΗ:** Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

**ΜΑΘΗΜΑ:** ΑΛΓΕΒΡΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

**Ημερομηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012**

### ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

#### ΘΕΜΑ Α

A.1. Θεωρία Σχολικό Βιβλίο (έκδοση 2011) σελίδα 94.

A.2. Θεωρία Σχολικό Βιβλίο (έκδοση 2011) σελίδα 95 .

- A.3. α) Σωστό  
 β) Λάθος  
 γ) Λάθος  
 δ) Λάθος  
 ε) Λάθος

A.4.

Αριθμός	Με μορφή λογαρίθμου	Με μορφή δύναμης
8	$\log_7 7^8$	$3^{\log_3 8}$
4	$\log_3 (3^4)$	$8^{2 \log_8 2}$
2012	$\log_{10} 10^{2012}$	$e^{\ln 2012}$

#### ΘΕΜΑ Β

B.1. Έχουμε  $f(x)=0 \Leftrightarrow 2x^3 - 3x^2 + 1 = 0$  (1).

Επειδή όλοι οι συντελεστές είναι ακέραιοι, οι πιθανές ακέραιες ρίζες της εξίσωσης  $f(x)=0$ , είναι το -1 ή το 1.

Το -1 δεν είναι ρίζα, γιατί  $f(-1) = 2(-1)^3 - 3(-1)^2 + 1 = -4$ .

Ενώ το 1 είναι ρίζα, γιατί  $f(1) = 2(1)^3 - 3(1)^2 + 1 = 0$ .

Με εφαρμογή του σχήματος Horner έχουμε:

2	-3	0	1	$p=1$
↓	2	-1	-1	
2	-1	-1	0	

Η εξίσωση (1) είναι τώρα ισοδύναμη με την  $(x-1)(2x^2-x-1)=0$

Έτσι,  $x-1=0 \Leftrightarrow x=1$

ή  $2x^2-x-1=0$  με ρίζες  $x=1$  ή  $x=-\frac{1}{2}$  αφού  $\Delta=9$ .

Οι ρίζες λοιπόν της εξίσωσης (1) είναι  $x=-\frac{1}{2}$  ή  $x=1$  (διπλή).

**B.2.** Επειδή το  $\alpha=1$  είναι η διπλή ρίζα τότε:

$$\eta \mu x = 1 \Leftrightarrow \eta \mu x = \eta \mu \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2} (\kappa \in \mathbb{Z}) \text{ ή}$$

$$x = 2\kappa\pi + \pi - \frac{\pi}{2} = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2} (\kappa \in \mathbb{Z}). \text{ Όμως, το } \beta = -\frac{1}{2} \text{ είναι η άλλη ρίζα οπότε:}$$

$$\sigma v \nu x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \sigma v \nu x = \sigma v \nu \left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi + \frac{2\pi}{3} \text{ ή } x = 2\kappa\pi - \frac{2\pi}{3} (\kappa \in \mathbb{Z}).$$

**B.3.** Επειδή η γραφική παράσταση της  $f$  δεν είναι πάνω από τον άξονα  $x'$  πρέπει:  $f(x) \leq 0 \Leftrightarrow (x-1)(2x^2-x-1) \leq 0$ . Το πρόσημο της  $f(x)$  φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	$-1/2$	1	$+\infty$
$x-1$	-	-	0	+
$2x^2-x-1$	+	0	0	+
$f(x)$	-	0	+	+

Έτσι, οι τιμές  $x \in \mathbb{R}$  για τις οποίες η γραφική παράσταση της  $f$  δεν

βρίσκεται πάνω από τον άξονα  $x'$  είναι:  $x \leq -\frac{1}{2}$  ή  $x=1$ .

**B.4.** Έχουμε  $f(-x) = 2(-x)^3 - 3(-x)^2 + 1 = -2x^3 - 3x^2 + 1$ .

Εκτελούμε την ευκλείδεια διαίρεση, όπως φαίνεται παρακάτω:

$$\begin{array}{r|l}
 -2x^3 - 3x^2 + 0x + 1 & x^2 + 1 \\
 \hline
 2x^3 & -2x - 3 \\
 \hline
 -3x^2 + 2x + 1 & \\
 + 3x^2 & \\
 \hline
 2x + 4 &
 \end{array}$$

Το πηλίκο είναι:  $\pi(x) = -2x - 3$  και το υπόλοιπο:  $\nu(x) = 2x + 4$ .

Επομένως,  $f(-x) = (x^2 + 1)(-2x - 3) + (2x + 4)$ .

## ΘΕΜΑ Γ

**Γ.1.** Αφού  $\ln \alpha, \ln \beta, \ln \gamma$  διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου ισχύει:

$$2\ln \beta = \ln \alpha + \ln \gamma \Leftrightarrow \ln \beta^2 = \ln(\alpha\gamma) \Leftrightarrow \beta^2 = \alpha\gamma \quad (1).$$

Για την συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ ,  $x \in \mathbb{R}$  έχουμε.

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = \beta^2 - 4\beta^2 = -3\beta^2 < 0, \text{ αφού } \beta > 0.$$

Επειδή  $\alpha > 0$  και  $\Delta < 0$  είναι  $f(x) > 0$ , για κάθε πραγματικό αριθμό  $x$ .

Έτσι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης  $h$  είναι το  $\mathbb{R}$ .

**Γ.2 α)** Είναι  $\alpha_1 = \alpha = \ln e = 1$ ,  $\alpha_2 = e^{\ln \beta} = \beta$ ,  $\alpha_3 = 10^{\log \gamma} = \gamma$ .

Επειδή  $\alpha_v = \alpha_1 \cdot \lambda^{v-1}$ , όπου  $\lambda$  ο λόγος της προόδου, τότε για  $v=5$  έχουμε  $\alpha_5 = \alpha_1 \cdot \lambda^4$ . Έχουμε  $\alpha_5 = 256$  και  $\alpha_1 = 1$ , επομένως  $256 = 1 \cdot \lambda^4 \Leftrightarrow \lambda^4 = 4^4 \Leftrightarrow \lambda = 4$  ή  $\lambda = -4$ .

Επειδή  $\lambda = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \frac{\beta}{1} > 0$  τότε η τιμή  $\lambda = -4$  απορρίπτεται.

Για  $\lambda = 4$  έχουμε  $\beta = \alpha_1 \cdot \lambda = 4$  και  $\gamma = \beta \cdot \lambda = 4 \cdot 4 = 16$ .

Έτσι, λοιπόν  $\alpha = 1$ ,  $\beta = 4$  και  $\gamma = 16$ .

**β)** Για  $\alpha = 1$ ,  $\beta = 4$ ,  $\gamma = 16$  είναι  $f(x) = x^2 + 4x + 16$  και  $g(x) = \eta \mu^2 x + 21$ .

Η εξίσωση  $f(\sigma v x) = g(x)$  είναι ισοδύναμη με την

$$\sigma v^2 x + 4\sigma v x + 16 = \eta \mu^2 x + 21 \Leftrightarrow \sigma v^2 x + 4\sigma v x - \eta \mu^2 x - 5 = 0 \quad (2).$$

Επειδή  $\eta \mu^2 x = 1 - \sigma v^2 x$  τότε από τη (2) έχουμε:

$$\sigma v^2 x + 4\sigma v x - 1 + \sigma v^2 x - 5 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2\sigma v^2 x + 4\sigma v x - 6 = 0 \Leftrightarrow \sigma v^2 x + 2\sigma v x - 3 = 0 \quad (3).$$

Θέτουμε  $\sigma v x = y$  όπου  $-1 \leq y \leq 1$  οπότε η (3) γίνεται  $y^2 + 2y - 3 = 0$  με ρίζες  $y = 1$  ή  $y = -3$ . Η  $y = -3$  απορρίπτεται.

Για  $y = 1$  έχουμε:  $\sigma v x = 1 \Leftrightarrow \sigma v x = \sigma v 0 \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi$ ,  $\kappa \in \mathbb{Z}$ .

Όμως,  $x \in (0, 4\pi] \Leftrightarrow 0 < x \leq 4\pi \Leftrightarrow 0 < 2\kappa\pi \leq 4\pi \Leftrightarrow 0 < \kappa \leq 2$ .

Ο  $\kappa$  είναι ακέραιος, οπότε  $\kappa = 1$  ή  $\kappa = 2$ .

Για  $\kappa = 1$ :  $x = 2\pi$  και για  $\kappa = 2$ :  $x = 4\pi$ .

**Γ.3.** Αφού  $\omega > 0$  τότε  $\beta_1 = 2\pi$  και  $\beta_2 = 4\pi$ . Η διαφορά είναι:  $\omega = \beta_2 - \beta_1 = 2\pi$ .

Ο νιοστός όρος της αριθμητικής προόδου ( $\beta_v$ ) είναι:

$$\beta_v = \beta_1 + (v-1)\omega = 2\pi + (v-1)2\pi = 2\pi v.$$

Το άθροισμα των  $v$  πρώτων δίνεται από τον τύπο  $S_v = \frac{v}{2}(\beta_1 + \beta_v)$ .

Επειδή  $S_v = 2550\pi$  έχουμε:

$$2550\pi = \frac{v}{2}(2\pi + 2\pi v) \Leftrightarrow 2550\pi = v\pi(v+1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow v(v+1) = 2550 \Leftrightarrow v^2 + v - 2550 = 0.$$

Η διακρίνουσα είναι  $\Delta = 1^2 - 4 \cdot (-2550) = 10201 = 101^2$

$$\text{Έτσι, } v = \frac{-1+101}{2} = 50 \text{ ή } v = \frac{-1-101}{2} = -51.$$

Επειδή ο  $v$  είναι θετικός ακέραιος, τότε  $v = 50$ .

### ΘΕΜΑ Δ

**Δ.1.** Για να ορίζεται η  $g$  πρέπει να ισχύει  $x > 0$ .

Έτσι,  $A_g = (0, +\infty)$  (είναι  $\ln 2 \neq 0$  γιατί  $2 \neq 1$ )

Για να συγκρίνουμε  $g(3)$  και 2 βρίσκουμε το πρόσημο της διαφοράς  $g(3) - 2$ .

$$\text{Είναι } g(3) - 2 = \frac{\ln 3}{\ln 2} - 2 = \frac{\ln 3 - 2\ln 2}{\ln 2} = \frac{\ln 3 - \ln 2^2}{\ln 2} = \frac{\ln 3 - \ln 4}{\ln 2} = \frac{\ln \frac{3}{4}}{\ln 2}.$$

Όμως  $\frac{3}{4} < 1$  άρα  $\ln \frac{3}{4} < 0$  και  $2 > 1$ , οπότε  $\ln 2 > 0$ .

Είναι  $g(3) - 2 < 0 \Leftrightarrow g(3) < 2$ .

Εναλλακτικά λύνουμε την

$$g(3) < 2 \Leftrightarrow \frac{\ln 3}{\ln 2} < 2 \Leftrightarrow \ln 3 < 2\ln 2 \Leftrightarrow \ln 3 < \ln 2^2 \Leftrightarrow \ln 3 < \ln 4 \text{ η οποία αληθεύει, γιατί } 3 < 4.$$

**Δ.2.** Για να ορίζεται η  $f$  πρέπει  $2^x - 3 > 0$  και  $\ln(2^x - 3) \neq 0$ .

$$\text{Έχουμε } 2^x - 3 > 0 \Leftrightarrow 2^x > 3 \Leftrightarrow \ln 2^x > \ln 3 \Leftrightarrow x \ln 2 > \ln 3 \Leftrightarrow x > \frac{\ln 3}{\ln 2} \text{ (παρότι } \ln 2 > 0).$$

και

$$\ln(2^x - 3) \neq 0 \Leftrightarrow \ln(2^x - 3) \neq \ln 1 \Leftrightarrow 2^x - 3 \neq 1 \Leftrightarrow 2^x \neq 4 \Leftrightarrow 2^x \neq 2^2 \Leftrightarrow x \neq 2.$$

$$\text{Από το Δ1 είναι } \frac{\ln 3}{\ln 2} < 2, \text{ οπότε } A_f = \left(\frac{\ln 3}{\ln 2}, 2\right) \cup (2, +\infty).$$

**Δ.3.** Είναι  $f(\log_2 \kappa) = \frac{1}{\ln(2^{\log_2 \kappa} - 3)} = \frac{1}{\ln(\kappa - 3)}$ , αφού  $2^{\log_2 \kappa} = \kappa$ .

Έχουμε  $f(\log_2 \kappa) < \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{\ln(\kappa-3)} < \frac{1}{2}$ .

Επειδή  $\kappa - 3 > 1$  ισχύει  $\ln(\kappa-3) > 0$ .

Οπότε  $\ln(\kappa-3) > 2 \Leftrightarrow \ln(\kappa-3) > \ln e^2 \Leftrightarrow \kappa-3 > e^2 \Leftrightarrow \kappa > 3 + e^2$ .

Τελικά  $\kappa \in (3 + e^2, +\infty)$ .

- Δ.4.** Το υπόλοιπο της διαίρεσης  $(-x^3 - 7x^2 + 6):(x+1)$

$$\text{είναι } v(x) = -(-1)^3 - 7(-1)^2 + 6 = 1 - 7 + 6 = 0.$$

Έχουμε  $v(x) = (f(\beta) - 1) \cdot x + g(\alpha) + g(\alpha^2) + g(\alpha^3) + \dots + g(\alpha^{20}) - \frac{210}{\ln 2}$ .

Από την ισότητα των δύο πολυωνυμών έχουμε :

$$f(\beta) - 1 = 0 \text{ και } g(\alpha) + g(\alpha^2) + g(\alpha^3) + \dots + g(\alpha^{20}) - \frac{210}{\ln 2} = 0.$$

Διαδοχικά έχουμε:

$$\begin{aligned} f(\beta) - 1 = 0 &\Leftrightarrow f(\beta) = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{\ln(2^\beta - 3)} = 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \ln(2^\beta - 3) = \ln e \Leftrightarrow 2^\beta - 3 = e \Leftrightarrow 2^\beta = e + 3 \quad (1) \text{ και} \\ &g(\alpha) + g(\alpha^2) + g(\alpha^3) + \dots + g(\alpha^{20}) - \frac{210}{\ln 2} = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{\ln \alpha}{\ln 2} + \frac{\ln \alpha^2}{\ln 2} + \frac{\ln \alpha^3}{\ln 2} + \dots + \frac{\ln \alpha^{20}}{\ln 2} = \frac{210}{\ln 2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{\ln 2} (\ln \alpha + 2 \ln \alpha + 3 \ln \alpha + \dots + 20 \ln \alpha) = \frac{210}{\ln 2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{\ln \alpha}{\ln 2} (1 + 2 + 3 + \dots + 20) = \frac{210}{\ln 2} \quad (2). \end{aligned}$$

To  $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 20$  είναι άθροισμα των 20 πρώτων όρων της αριθμητικής

προόδου με  $\alpha_1 = 1$ ,  $\omega = 1$ . Ετσι,  $S_{20} = \frac{20}{2} (\alpha_1 + \alpha_{20}) = 10(1 + 20) = 210$ .

Από τη (2) προκύπτει  $\frac{210 \cdot \ln \alpha}{\ln 2} = \frac{210}{\ln 2} \Leftrightarrow \ln \alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = e \quad (3)$

Έτσι, έχουμε  $e^{\beta \cdot \ln 2} = (e^{\ln 2})^\beta = 2^\beta = e + 3 = \alpha + 3$ .